

GABINETE DE COMUNICAÇÕES HUBBARD  
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCOB DE 5 DE FEVEREIRO DE 1970R

Rev. 16 Ago. 83

AOS  
Classe VIIIIs  
Curso Solo de OT III  
C/Ses Solo

(Revisto para apagar referências a correr R3R  
num OT, conforme HCOB 12 Set.78,  
DIANÉTICA, PROIBIDA EM CLEARs E OTs).  
(Revisões em Scripto)

SECRETO

O BÁSICO SOBRE BTs

Eu isolei a forma como um theta fica preso a outro theta. Isto dá a base dos clusters e de ter BTs.

O ciclo é o seguinte: um theta colide com outro. Esse faz uma imagem da colisão. Outros BTs vão aderir à imagem.

O momento do verdadeiro contacto dos thetas foi breve, mas a imagem (contendo uma paragem ou retirada) tende a permanecer.

Os Thetas ficam com a ideia de que podem permanecer presos quando veem essas imagens ocorrer.

Obtemos por isso o conceito de um "corpo theta negro". Ele seria composto de verdadeiros BTs presos a um theta, mais as imagens dos BTs presas a um theta.

Uma resposta a tudo isto é encontrar a primeira imagem feita por um theta, contendo outro theta.

Se não imediatamente disponível, a instância mais antiga em que um theta contactou (colidiu, chocou, atacou) outro theta, poderia ser alcançada Datando/Localizando o facto de, de repente, ser atingido por CLs ou dores estranhas. (Ref. HCOB 15 Nov. 78, DATAR E LOCALIZAR).

A ideia é achar e explodir a primeira imagem que uma pessoa fez de outro theta.

Isto abre outro caminho para "explodir" BTs, Datando/Localizando num BT a primeira imagem que o BT uma vez fez de outro theta.

L. RON HUBBARD

Fundador